

隽清®



甲类

## 羧甲司坦口服溶液说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

### 【药品名称】

通用名称:羧甲司坦口服溶液

英文名称:Carbocysteine Oral Solution


汉语拼音:Suojiasitan Koufurongye

### 【成份】

本品每10毫升含羧甲司坦 0.5克。辅料:羧甲纤维素钠、三氯蔗糖、羟苯甲酯钠、焦糖色、甜橙香精,氢氧化钠、纯化水。

化学名称:S-(羧甲基)半胱氨酸

化学结构式:



分子式:C<sub>5</sub>H<sub>9</sub>NO<sub>4</sub>S

分子量:179.19

### 【性状】

本品为棕黄色至浅棕色的粘稠液体;气香。

### 【作用类别】

本品为祛痰类非处方药药品。

### 【适应症】

用于治疗慢性支气管炎等疾病引起的痰液粘稠、咳痰困难患者。

### 【规格】

10毫升:0.5克

### 【用法用量】

口服,成人一次10毫升,一日3次。

### 【不良反应】

- 胃肠道疾病,如胃部不适、胃痛、恶心、呕吐、腹泻、胃或肠出血。
- 过敏性皮疹和过敏反应,如荨麻疹、瘙痒、皮肤斑疹或丘疹、血管性水肿。
- 固定性色素性红斑。
- 大疱性皮肤病,如多形性红斑、史蒂文斯-约翰逊综合征。
- 轻度头痛。

### 【禁忌】

- 对本品的活性成份或任何其它成份(特别是羟苯甲酯钠)过敏者禁用。
- 消化道溃疡活动期患者禁用。

### 【注意事项】

- 1.用药7日后,如症状未缓解,应立即就医。
- 2.有消化道溃疡史者慎用。
- 3.儿童应在医师指导下用药。

4.孕妇、哺乳期妇女,老年人慎用。

5.对本品过敏者禁用,过敏体质者慎用。

6.本品性状发生改变时禁止使用。

7.请将本品放在儿童不能接触的地方。

8.请勿与强镇咳药或减少支气管粘液分泌的药物(如阿托品)同时使用。请勿与其他与本品活性成份(如羧甲司坦)相同的产品合并用药,以免超过推荐剂量。如正在使用其他药品,使用本品前请咨询医师或药师。

9.本品不得随餐服用。

10.如采用无糖或低糖饮食,亦可使用本品。

11.本品含羟苯甲酯钠,可能引起过敏反应(反应可能延迟)。

12.本品含钠。每15ml溶液含有96.9mg钠。严格钠饮食的患者慎用。

### 【药物相互作用】

1.应避免同时服用强镇咳药,以免痰液堵塞气道。

2.如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用,详情请咨询医师或药师。

### 【药理作用】

本品为粘液调节剂,主要作用于支气管腺体的分泌,使低粘度的唾液粘蛋白分泌增加,高粘度的岩藻粘蛋白产生减少,因而使痰液的粘稠性降低而易于咳出。

### 【贮藏】

遮光,密封,阴凉(不超过20°C)保存。

### 【包装】

钠钙玻璃管制口服液体瓶和口服液瓶用易刺铝盖,配有吸管。

10毫升/瓶,6瓶/盒,10瓶/盒,15瓶/盒。

### 【有效期】

24个月。

### 【执行标准】

国家药品监督管理局药品注册标准YBH08652023

### 【批准文号】

国药准字H20234113

### 【说明书修订日期】

2023年09月18日

### 【药品上市许可持有人】

企业名称:北京康祯生物科技有限公司

注册地址:北京市顺义区北台路北石槽段6号院1号楼3层301室

邮政编码:101301

联系电话:010-60422673

### 【生产企业】

企业名称:北京诚济制药股份有限公司

生产地址:北京市顺义区中北工业区(北石槽镇)

邮政编码:101301

电话号码:010-62991779

传真号码:010-53934516

如有问题可与药品上市许可持有人或生产企业联系

BC002A02